

Příbalová informace:

Název přípravku:

GENABIL® inj. ad us. vet.

Výrobce:

Boehringer Ingelheim, Dánsko

Držitel rozhodnutí o registraci:

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH,
55 216 Ingelheim am Rhein, SRN**

Složení:

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Menbutonum 100 mg
Chlorocresolum 2 mg

Dále:

Natrii disulfis, Acidum edeticum, Olaminum, Aqua pro iniectiōne.

Indikační skupina:

Veterinaria – Pharmaceutica. Veterinární stomachika.

Charakteristika:

Přípravek GENABIL inj. ad us. vet. obsahuje jako účinnou látku *menbuton*, která má po parenterálním podání u domácích a hospodářských zvířat stimulační účinky na funkce zažívacího traktu, především na sekreci žluče a na funkce pankreatu.

Přípravek GENABIL inj. ad us. vet. účinným způsobem zvyšuje po parenterální aplikaci u zvířat sekreci žluče v normální koncentraci (v doporučených aplikačních dávkách dvakrát) a normální koncentrace pankreatické šťávy a pepsinu (v doporučených aplikačních dávkách pětkrát).

Farmakologické údaje:

Aktivita účinné složky přípravku (*menbuton*) vychází ze specifického působení přímo na žlázy, nikoli přes parasymptický systém, jak by se předpokládalo.

Cholinergní efekt nebyl na izolovaném střevě prokázán; ani ve vysokých dávkách nedochází ke snížení krevního tlaku nebo k alteraci srdečního tepu. Po aplikaci do oka nepůsobí jako pilocarpin zúžení pupily.

Přípravek má obecně nízkou toxicitu, v doporučených dávkách je zcela bez toxického efektu.

Indikace:

Stimulace zažívacího aparátu - biliární sekrece a funkce pankreatu.

Skot: přeplnění žaludku, inapetence, zácpa, gastroenteritidy, jaterní dystrofie, hepatóza, jako adjuvans při léčbě ketózy a tympanie

Prase: inapetence, zácpa, primární a sekundární počínající indigesce, profylakticky při puerperální indigesci, adjuvans při léčbě enteritid, toxická jaterní dystrofie, hepatóza

Ovce: toxemie v graviditě (postačuje jedna aplikace, která může být příp. kombinována s aplikací kortikosteroidu a glycerinu, což není nutné je-li zvíře ošetřeno v počátcích intoxikace), ostatní indikace jako u skotu

Pes: anorexie, inapetence, hepatóza, dysfunkce pankreatu, po chirurgických zákrocích, nefritida.

Kontraindikace:

Přípravek GENABIL inj. ad us. vet. se nesmí používat u koček a koní.

Přípravek nepoužívat u zvířat se srdeční insuficiencí.

Nežádoucí účinky:

Při rychlé intravenózní aplikaci může docházet k přechodné hypotenzi, vzácně až ke kolapsu. Zvíře může ulehnout, avšak během několika minut se vrací vše do normálu. Vzhledem k možnosti výskytu nežádoucích účinků nelze použít u koní.

Interakce:

Přípravek GENABIL inj. ad us. vet. se nesmí míst s roztoky obsahující kalcium, prokain-penicilin, B-komplex.

Přípravek lze mísit s přípravky ACTH, dihydrostreptomycinem, vitamínem A.

Dávkování:

Býk: 20 – 50 ml *pro toto*

Kráva: 20 – 40 ml *pro toto*

Mladý skot: 15 – 25 ml *pro toto*

Tele: 5 – 15 ml *pro toto*

Ovce: 5 – 6 ml *pro toto*

Prase: 10 – 20 ml *pro toto*

Prase-výkrm: 1 ml / 10 kg ž.hm.

Pes: 0,1 ml / 1 kg ž.hm.

Dávku je možno opakovat za 24 hodin.

Způsob použití:

Přípravek GENABIL inj. ad us. vet. se aplikuje pomalu intravenózně nebo hluboko intramuskulárně.

Zvláštní upozornění:

Vzhledem k možnosti výskytu nežádoucích účinků nelze použít u koní.
Po aplikaci přípravku GENABIL inj. ad us. vet. dochází často ke zvýšenému slzení, slinění a močení zvířat, výkaly bývají tmavě zbarveny (žluč).
U skotu dochází zpravidla ke zvýšené motilitě bачору.

Uchovávání:

Přípravek se skladuje v suchu při teplotě 15°C - 25°C, mimo dosah dětí.

Balení:

Lékovky 1 x 100ml.

Ochranná lhůta:

Maso: 3 dny.

Mléko: 2 dny.

Místo vpichu je nutno konfiskovat 15 dní po aplikaci.

Exspirace:

42 měsíců. Po otevření spotřebovat ihned.

Obaly a všechny zbytkový obsah přípravku se likviduje podle platných předpisů ČR.

Datum poslední revize textu: 22.9.2004